# باب پنجم

## مجرباتِ ہومیوپیتھی

مجرباتِ ہومیوپیتھی کے تحت اس باب میں تمام علامات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ قارئین کے لیے آسانی رہے' علاوہ ازیں ایسی علامات جو گذشتہ صفحات پر موجود نہیں ہیں وہ بھی یہاں پر درج کر دی گئی ہیں:

نوٹ: ڈاکٹر کینٹ' ڈاکٹر بورک' ڈاکٹر بوننگ ہاسن اور ڈاکٹر لپے کی ریپرٹری کے ذریعے ترتیب دی گئی علامات حسب ذیل ہیں' ان میں کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ روزمرہ پریکٹس کے دوران بہت مفید اور زوداثر ثابت ہوئی ہیں' قارئین کی سہولت کے لیے گذشتہ صفحات پر دی گئیں اور مزید علامات کو یہاں پر یکجا کر دیا گیا ہے:

### ا۔ ایستادگی

☆ ایستادگیاں ہر وقت — فاسفورس۔۲۰۰

☆ ایستادگیاں صرف دن کے وقت — کلاڈیم' کیمیلیس' فاسفورس۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف صبح کے وقت — امونیم کارب۔۲۰۰

☆ ایستادگیاں صرف کھڑے ہونے کی حالت میں — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف جاگنے پر — سی پیلیا۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف قبل از دوپہر — کیپ سیکم۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف دوپہر کو — نکس وامیکا۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف بعد از دوپہر — نکس وامیکا۔۳۰



☆ ایستادگیاں صرف شام کو — برائکا کارب' نیٹرم سلف۔۳۰

☆ ایستادگیاں صرف رات کو — آرم میٹ' کیلکیریا' ایسڈ فلور۔۳۰

☆ ایستادگیاں کھانسنے پر — کیناباس سٹائیوا۔۳۰

☆ ایستادگیاں پیشاب کے بعد — ایلوز۔۳۰

☆ ایستادگیاں بستر میں گرم ہو جانے پر — پلاٹینم' کروڈم۔۳۰

☆ ایستادگیاں مسلسل ہوں — کینتھرس۔۳۰

☆ ایستادگیاں لیٹنے سے — اگیریکس' ایسڈ۔۳۰

☆ ایستادگیاں کھانے کے بعد — ہائیوسائمس۔۳۰

☆ ایستادگیاں بوڑھے آدمیوں میں — کاسٹی کم۔۳۰

☆ ایستادگیاں شدید غضب ناک — کالی کارب۔۲۰۰

☆ ایستادگیاں تھوڑی دیر ہیں — کونیم' گریفائٹس' نیٹرم کارب۔۳۰

☆ ایستادگیاں نیند کے دوران — ایسڈ فلور' نیٹرم کارب۔۳۰

☆ ایستادگیاں پاخانہ کرنے کے دوران — اگنیشیا' تھوجا۔۳۰

☆ ایستادگیاں شکم میں درد کے ساتھ — زنکم میٹ۔۳۰

☆ ایستادگیاں رات کے کھانے کے دوران — نکولم۔۳۰

☆ ایستادگیاں بغیر خواہش کے — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ ایستادگیاں دردناک ہوں — کینتھرس' نکس وامیکا۔۳۰

☆ ایستادگیاں خواب کے ساتھ — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ ایستادگیاں انزال کے بعد — نکس وامیکا' ایسڈ فاس۔۳۰

☆ ایستادگیاں بار بار گی کے ساتھ — کالی بائی کروم۔۳۰

☆ ایستادگیاں بار بار عضوِ تناسل کو مسلنے کے ساتھ — سٹرامونیم۔۳۰

☆ ایستادگیاں ہوں لیکن خواہش نہ ہو — برائی اونیا۔۲۰۰

☆ ایستادگیاں صبح کے وقت ہو جبکہ عضو سُن ہو — ایمبر اگریسیا۔۳۰

☆ ایستادگیاں نامکمل چکروں کے ساتھ — ٹیرنٹولا۔۳۰

☆ ایستادگیاں نیند سے جگادیں — بیچر سلف' سیلی شیا۔۳۰

☆ ایستادگیاں سواری کرتے وقت — برائکا کارب' کیناٰبس انڈیکا۔۳۰

☆ ایستادگیاں بغیر خواہش کے — کلکیر یافاس۔۳۰

☆ ایستادگیاں بیوی کی بجائے غیر عورت کے ہوں — سٹیفی سیگریا۔۲۰۰

☆ ایستادگیاں عضو تناسل معمولی سی رگڑ یا دباؤ سے — لیک کینائم۔۳۰

☆ ایستادگیاں عضو کو ملنے یا دبانے پر ہوں — میوریکس۔۳۰' لیک کینی نم۔۲۰۰

چائنا۔۳x

☆ ایستادگیاں نامکمل پیشاب کی نالی کی سوزش کے ساتھ — پٹرولیم۔۳۰

☆ ایستادگی ندارد جنس مخالف سے بوس و کنار کے باوجود — کلاڈیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد بغل گیر ہونے سے بھی — اناسوڈیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد مباشرت کے وقت — کلاڈیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد نیند سے جاگنے پر — اوپیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد بغل گیر ہوتے ہی — کونیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد + جنسی خواہش ندارد — نائٹرک ایسڈ' سیپونجیا۔۳۰' ۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد + جنسی خواہش ندارد — سمبوکس۔۳۰' ۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد شہوانی خیالات سے بھی — نیٹرم فاس (؟) نیوفریلیم۔Q

☆ ایستادگی ندارد + عضو تناسل کی لاغری — ٹوبیلم۔۲۰۰

☆ ایستادگی ندارد بوڑھوں لوگوں میں — لائیکوپوڈیم۔۱۰۰۰

☆ ایستادگی نامکمل ہو — کلاڈیم۔۳۰

☆ ایستادگی کم ہو — سیپیا۔۲۰۰

☆ ایستادگی کمزور ہو — تھیریوڈیم۔۲۰۰

☆ ایستادگی کی طاقت ہی نہ ہو — نیٹر میور۔۳۰



☆ ایستادگی کمزور یا ندارد — لائیکوپوڈیم۔۱۰۰۰

☆ ایستادگی بوقت جماع ختم ہو جائے — ارجنٹم نائٹریکم۔۲۰۰

☆ مباشرت کے دوران عضو ڈھیلا رہے — کلاڈیم۔۲۰۰' سیلی نیم۔۲۰۰' ۱۰۰۰

☆ پُر درد ایستادگی لگاتار رہے — کینتھرس۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی بوڑھے آدمیوں میں — کاسٹیکم۔۲۰۰

☆ پُر درد ایستادگی جماع کا خیال آتے ہی — فاسفورس۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی صبح کے وقت — برائکا کارب۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی کھانسنے سے — کینتھرس۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی پیشاب کرنے کے بعد — نیٹرم کارب۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی گاڑی میں سوار ہونے سے — کلکیر یافاس۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی گھوڑے پر سواری کرنے سے — کیناٰبس انڈیکا۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی انزال کے بعد — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ پُر درد ایستادگی رات کے وقت — فیرم فاس۔۶x

## ۲۔ احتلام

☆ احتلام کی کثرت کی مجرب دوا — تھائی مول۔Q

☆ احتلام کی کثرت کسی بھی سبب — تھوجا۔۳۰

☆ احتلام سے گھٹنوں میں نمایاں کمزوری پائی جائے — ڈایاسکوریا۔۳۰

☆ احتلام جو بغیر خواب کے ہوں — کلاڈیم۔۳۰

☆ احتلام کے بعد جاگنے پر خوف محسوس ہو — ایکونائٹ۔۳۰

☆ احتلام بغیر انتشار کے ہو — کالی فاس۔۲۰۰' ارجنٹم نائٹریکم۔۲۰۰

☆ احتلام جس کے ساتھ تیزابیت کی شکایت ہو — نیٹرم فاس۔۲۰۰

☆ احتلام سردی کی وجہ سے ہو — نیٹرم میور۔۲۰۰

☆ احتلام ہر رات ہو — نیٹرم فاس۔۳۰' نیٹرم میور۔۳۰

☆ احتلام ہر دوسری رات ہو — پکرک ایسڈ۔۳۰

☆ احتلام ہر تیسری یا چوتھی رات کو — نکس وامیکا۔۳۰

☆ احتلام ایک ہی رات میں کئی بار — ڈائسکوریا۔۳۰

☆ احتلام مریض کو بے خبری میں — سلیکس نائیگرا۔۳۰' کلاڈیم۔۳۰

☆ احتلام جس کے ساتھ نامردی کی شکایت ہو — فاسفورس۔۳۰

☆ احتلام جنسی خیالات کی کثرت سے — ایسڈ فاس۔x۳

☆ احتلام کے باعث مریض کو بھوک نہ لگے اور کمزوری ہو — چائنا۔۳۰

☆ احتلام کے باعث خصیوں میں درد ہو — ایگنس کاسٹس۔۳۰

☆ احتلام کے باعث اعصابی جھٹکے لگیں — کیوپرم میٹ۔۳۰

☆ احتلام کے باعث کمر درد ہو — کوبالٹم۔۳۰

☆ احتلام گرم اور ثقیل اشیاء کی کثرت سے — نیٹرم فاس۔۳۰

☆ احتلام کثرت ایستادگی کے باعث — نکس وامیکا۔۲۰۰

☆ احتلام قبض کے سبب — نکس وامیکا۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام جماع کے باوجود — نیٹرم میور۔۳۰

☆ احتلام میں خون خارج ہو — کینتھرس۔۳۰

☆ احتلام موٹے آدمیوں کا — کلکیریا کارب۔۳۰

☆ احتلام کے بعد ٹانگوں میں ٹھنڈک — گریفائٹس۔۳۰

☆ احتلام میں خون یا خون آمیز مواد آئے — مرک سال' کینتھرس۔۳۰

☆ احتلام اکثر صبح کے وقت ہو — نکس وامیکا۔۳۰

☆ احتلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہو — کلکیریا کارب۔۳۰

☆ احتلام بغیر ایستادگی کے عضو مرجھایا ہوا — ارجنٹم نائٹریکم۔۳۰

☆ احتلام بغیر خواب کے — ارجنٹم نائٹریکم' جیلسی میم' [illegible]۔۳۰

☆ احتلام کے بعد سردی اور سستی محسوس ہو — نیٹرم میور۔x۶



☆ احتلام کے بعد کمزوری محسوس ہو — کاربو انی میلس۔۳۰

☆ احتلام کے بعد شہوت کا زور ہو — نیٹرم میور۔x۶

☆ احتلام کے بعد پسینے آئیں — کلکیریا کارب۔۳۰

☆ احتلام جس کے ساتھ اعضائے تناسل ڈھیلے ہوں — جیلسی میم۔۳۰

☆ احتلام کے سبب مرگی کے دورے پڑیں — کیوپرم میٹ۔۳۰

☆ احتلام جس کی وجہ کرم امعاء ہوں — سائنا۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام بغیر ایستادگی کے ہو جائے — گریفائٹس' جیلسی میم۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام بغیر ایستادگی کے ہو جس کے ساتھ درد ہو — کالی فاس۔۲۰۰

☆ احتلام جس کے ساتھ تکلیف دہ ایستادگی ہو — پکرک ایسڈ۔۳۰

☆ احتلام لگاتار ہونے والا — فاسفورس۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام لگاتار ہو، جس کی وجہ بہت زیادہ ایستادگیاں ہوں — پلمبم میٹ۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام صبح کے وقت ایستادگی کے ساتھ — سورائنم۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام جس کی وجہ حد سے بڑھی ہوئی خواہش ہو — روٹا۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام جس کے ساتھ عضو ڈھیلا ڈھالا ہو — سلی نیم۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام دن کے وقت سونے سے — کاسٹیکم' جیلسی میم' فاسفورس۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام ہمیشہ کمر کے بل لیٹنے سے ہو — کوبالٹم' کالوسنتھس' ہائپریکم۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام کے بعد کمر میں چبھن والا درد اور ہاتھ سرد — مرکیورس۔۳۰

☆ احتلام جس کے بعد کمر میں نچلی طرف درد ہوں — اسٹی لاگو۔۳۰

☆ احتلام جس کے بعد ڈمچی کی ہڈی میں درد اور کمزوری — گریفائٹس۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام کے بعد سانس میں دقت ہو — سٹیفی سیگریا۔۲۰۰

☆ احتلام جس کے ساتھ سانس کی بندش اور سینے میں درد — فاسفورس۔۳۰'۲۰۰

☆ احتلام کے بعد لرزہ طاری ہو — نیٹرم میور۔۳۰

☆ احتلام باوجود جماع کے دن یا رات میں — ڈجی ٹیلس۔۳۰

## ۳۔ انزال

☆ انزال منی سے تکالیف بڑھ جائیں — سی پیا۔۳۰' سیلی نیم۔۳۰

☆ انزال کے بعد جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہو — میزیریم۔۳۰

☆ انزال کے بعد مریض غش کھا جائے — ایسافوٹیڈا۔۳۰' ایسڈ فاس۔۳۰

☆ انزال کے دوران/بعد مرگی کے دورے پڑیں — نیٹرم فاس۔۳۰' اریکا یوریفس۔۳۰

☆ انزال کے بعد بے حس و بے حرکت — کاسٹی کم۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد سستی و آرام طلبی — سیپیا۔۳۰' نیٹرم کارب۔۳۰

☆ انزال کے بعد پریشانی لاحق ہو — پٹرولیم۔۳۰' اگاریکس۔۳۰

☆ انزال کے بعد دماغی اُلجھن ہو — سیلی نیم۔۳۰

☆ انزال کے بعد دماغی کمزوری ہو — سیلی نیم۔۳۰' کاربوویج۔۳۰

☆ انزال کے بعد چڑچڑاپن ہو — سٹافی سیگریا۔۲۰۰' نکس وامیکا۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد افسردگی و اُداسی — نکس وامیکا۔۳۰' پلساٹیلا۔۳۰

☆ انزال کے بعد خوشی و زندہ دلی — پیرمیتھا ئیلکم۔3X

☆ انزال کے بعد دماغی سستی / کند ذہنی — کاسٹی کم۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد مریض کو رونا آئے — ہپومینس۔۳۰

☆ انزال کے بعد چکر آئیں — سارساپریلا۔۳۰' سی پیا۔۳۰

☆ انزال کے بعد سر درد — کلکیریا کارب۔۲۰۰' نکس وامیکا۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد آنکھوں کی کمزوری — پلساٹیلا۔۳۰' جبورانڈی۔۳۰

☆ انزال کے بعد آنکھوں میں دھندلاہٹ — فاسفورس۔۳۰' چائنا۔۳۰

☆ انزال کے بعد نظر مدہم ہو جائے — سی پیا۔۳۰' لی لیم ٹگ۔۳۰

☆ انزال کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو — ایسافوٹیڈا۔۳۰

☆ انزال کے بعد نیند میں بے قراری ہو — ایلوز۔۳۰

☆ انزال کے بعد پسینہ آئے — سی پیا۔۳۰' کلکیریا کارب۔۳۰



☆ انزال کے بعد شکم میں تناؤ — بی پیا۔۳۰' ۲۰۰

☆ انزال کے بعد کنج ران میں سوئیاں چُبھنے کا احساس — پٹرولیم۔۳۰

☆ انزال کے بعد جاڑا / سردی لگے — مرک سال۔۳۰

☆ انزال کے بعد پیشاب کی اچانک حاجت — بوریکس۔۳۰' سلفر۔۳۰

☆ انزال کے وقت/بعد پیشاب کی نالی میں جھٹکے لگیں — پٹرولیم۔۳۰

☆ انزال کے وقت/بعد پیشاب کی نالی میں درد — سارساپریلا۔۳۰' کوبالٹم۔۳۰

☆ انزال کے بعد پشت پر پسینہ آئے — سی لیشیا۔۳۰

☆ انزال کے بعد پشت پر درد ہو — سٹافی سیگریا۔۲۰۰' کالی برومم۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد پشت پر جلن دار درد ہو — مرک سال۔۳۰' فاسفورس۔۳۰

☆ انزال کے بعد چوتڑ کے مقام پر درد ہو — گریفائٹس۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد ٹانگیں کانپیں — گریفائٹس۔۳۰

☆ انزال کے بعد اعضاء میں کمزوری — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ انزال کے بعد ہاتھ ٹھنڈے ہوں — مرک سال۔۳۰

☆ انزال کے بعد پاؤں ٹھنڈے ہوں — ایلوز۔۳۰' نکس وامیکا۔۲۰۰

☆ انزال کے بعد رانوں میں کمزوری واقع ہو — اگاریکس۔۳۰' کلکیریا کارب۔۳۰

☆ انزال کے بعد رانوں میں درد ہو — اگاریکس۔۳۰

☆ انزال کے بعد بہت دیر تک جھٹکے لگیں — سیلی نیم۔۳۰

☆ انزال بہت جلد اور لطف نہ آئے — بیوفورانا۔۳۰

☆ انزال پُر درد ہو — اگاریکس۔۳۰

## ۴۔ پراسٹیٹ گلینڈ

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا جس کے ساتھ مقعد میں وزن کا احساس — کیلکس۔۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا اور سوجن و درد — کیناٹس سٹائیوا۔۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا جس کے ساتھ سختی پائی جائے — کونیم۔۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا (بوڑھے لوگوں میں) مزمن امراض — پکرک ایسڈ، ارجنٹم نائٹریکم ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا اور انفیکشن کا پایا جانا — پلسا ٹیلا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا مریض اس مقام پر ہاتھ نہ لگا سکے — سی شیو ۔ 3x

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا جس کے ساتھ بواسیر کا عارضہ بھی ہو — سٹیفی سیگریا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا جو گنوریا کے بعد ہو — تھوجا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا' پیشاب قطرہ قطرہ آئے — فاسفورس ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا اس کا ایک حصہ سخت ایک نرم ہو — سی لیشیا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا بوڑھے لوگوں میں — ایلوز ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا جس کے ساتھ بار بار پیشاب کی حاجت ہو — سباڑ یلا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا سخت محسوس ہونا — کونیم ۔ ۲۰۰' آئیوڈیم ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کا سخت محسوس ہونا اور بڑھا ہوا ہونا — سی شیو ۔ 3x

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں خارش محسوس ہو — کونیم ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ کے مقام پر کپکپاہٹ محسوس ہو — فارمیکا روفا ۔ 3x

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جماع کے بعد — ایلم سیپا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو ایستادگی کے دوران ہو — ایلومینا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو گنوریا کے بعد ہو — کیپ سیکم ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو سفر کے بعد زیادہ ہو — سٹیفی سیگریا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو بیٹھتے وقت ہو — چمافیلا' سائیکلیمن ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو کھڑے ہوتے وقت ہو — سائیکلیمن ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو چلتے وقت ہو — سائیکلیمن ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو چلتے وقت کم ہو — رہسٹاکس ۔ ۳۰' ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو پاخانہ کے بعد ہو — فاسفورس ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو پیشاب کرتے وقت ہو — اسپس میلی فیکا ۔ ۳۰' لائیکوپوڈیم



☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو پیشاب کرنے کے بعد ہو — پلسا ٹیلا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو پیشاب روکنے سے ہو — لوکا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جب پیشاب کی حاجت ہو — رہسٹاکس' سائیکلیمن ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو صبح' دوپہر اور جماع کے بعد ہو — ایلم سیپا ۔ ۳۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو جماع کے دوران ہو — ایلومینا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو ایستادگی کے وقت ہو — ایلومینا ۔ ۳۰' ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو کاٹنے والا ہو — کاربوایج میلس' کونیم ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں درد جو جلن دار ہو — ایلیم سیپا' لائیسین'
ایسڈ فاس ۔ ۳۰' ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں انفیکشن ہو — ہیپر سلف' سی لیشیا ۔ ۲۰۰

☆ پراسٹیٹ گلینڈ میں تناؤ کا احساس ہو — لائیکوپوڈیم' تھوجا ۔ ۲۰۰

## ۵۔ پیشاب

☆ پیشاب کا قطرہ نالی میں رہ جانے کا احساس — کالی بائیکروم ۔ ۳۰

☆ پیشاب کے نکلنے کا احساس ہی نہ ہو — کاسٹی کم ۔ ۲۰۰

☆ پیشاب کثرت سے آئے (مردانہ عوارض کے سبب — ایکوزیٹم ۔ ۳۰

☆ پیشاب کے دوران جلن اور درد — کینتھرس ۔ ۳۰

☆ پیشاب کی فوری حاجت ہو روک نہ سکے — پیٹروسیلی نم ۔ ۳۰

☆ پیشاب کی کثرت اور پیشاب کے بعد قطرے آئیں — سٹیفی سیگریا ۔ ۳۰

☆ پیشاب مقدار میں کم اور قطرہ قطرہ آئے — اسپس میلی فیکا ۔ ۳۰

☆ پیشاب غیر ارادہ طور پر خارج ہو جائے — کاسٹی کم ۔ ۲۰۰

☆ پیشاب چلتے پھرتے خارج ہو — کاسٹی کم ۔ ۲۰۰

☆ پیشاب کے بعد یہ احساس کہ ابھی باقی ہے — کلی میٹس ۔ ۳۰

☆ پیشاب میں سفیدی مائل رطوبت خارج ہو — ایسڈ فاس ۔ Q

## ۶۔ جنسی رجماع کی خواہش کی زیادتی

☆ جماع کی خواہش حد سے زیادہ ہو — فلورک ایسڈ۔۲۰۰
☆ جماع کی خواہش ہو لیکن عضو ڈھیلا ڈھالا ہو — نکس موسکاٹا۔۳۰
☆ جماع کے لیے اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو — انا کارڈیم۔۱۰۰۰
☆ جماع کی خواہش لیکن طاقت مفقود — کلاڈیم۔۲۰۰
☆ جماع کی خواہش اور ایستادگی دونوں زیادہ — پکرک ایسڈ۔۳۰
☆ جماع کی خواہش لیکن طاقت نہ ہو — فاسفورس۔۲۰۰
☆ جماع کے لیے مرد پاگل ہو — ایسڈ فلور۔۲۰۰
☆ جماع کی ایسی خواہش کہ مریض سو نہ سکے — پکرک ایسڈ۔۳۰
☆ جماع کی خواہش دب جانے کے بد اثرات — کونیم۔۲۰۰
☆ جنسی خواہش کو روکنے سے تکالیف میں زیادتی ہو ایپس۔۳۰ پلساٹیلا۔۳۰
☆ مرد میں جنس مخالف کو دیکھ کر شہوت فوراً ابھرے — پکرک ایسڈ۔۲۰۰
☆ مرد میں جنسی خواہش و طاقت دونوں ناپید — ایگنس کاسٹس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کو دبانے سے تکالیف میں کمی ہو — کلاڈیم۔۲۰۰
☆ جنونِ شہوت و جنسی خواہش — اوری گینم۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی ساتھ ہی منی کا اخراج پایا جائے — فارمیکا رُوفا۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی شہوانی ہیجان کی عمدہ دوا — جنسنگ۔ Q'۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی' احتلام کی کثرت — فاسفورس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی عضو تناسل میں اشتعال و ہیجانی کیفیت — کیمفر۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی منی کے زیادہ مقدار میں انزال کے بعد کمزوری — پکرک ایسڈ۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی شراب اور کوکین کے بے جا استعمال سے — نکس وامیکا۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی سن بلوغت کو پہنچتے ہی خواہش جماع ابھر کر آئے — مینسی نیلا۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی کو قابو کرنے والی دوا — فاسفورس۔۳۰'۲۰۰



☆ جنسی خواہش کی زیادتی مغرور لوگ جو دوسروں کو حقیر جانیں — پلاٹینا۔۳۰'۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی جنونِ شہوت کے باعث مریض کو نیند نہ آئے — ریپنے نس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی لیکن جماع نہ کر سکے — کلاڈیم۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی لیکن طاقتِ جماع نہ ہو — سلی نیم۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی ذہن ہر وقت جنسی معاملات میں لگا رہے — سٹیفی سیگریا۔۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی بوڑھے آدمیوں میں — لائیکوپوڈیم' سلی نیم۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی رجماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے — فاسفورس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی جس کے ساتھ بدن میں لرزہ — پلاٹینا۔۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + عضو کمزور و لاغر — اگاریکس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + قبض و بدہضمی کے ساتھ — ایلومینا' انا کارڈیم۔۳۰'۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + تکلیف دہ ایستادگی — کینتھرس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی دن رات جنسی خیالات گھیرے رکھیں — چائنا۔3x
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + اعضائے تناسل ذکی الحس — کوکولس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + ایسے جیسے ابھی انزال ہو جائے گا — ہیپر سلف۔۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + عملی طور پر ناکارہ — لیکسس۔۲۰۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + ذہنی و جسمانی دونوں طرح سے — میزریم۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی + پیشاب کی حاجت — موسکس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی بالخصوص دوپہر کے وقت — اگزیلک ایسڈ۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے — کونیم' پلساٹیلا۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی زیادتی رنہاتے ہوئے جنسی عمل کا سا احساس ہو — نیٹرم کارب۔۳۰

## ۷۔ جنسی خواہش کی کمی

☆ جنسی خواہش کی کمی و ناپید — بربیرس۔۳۰
☆ جنسی خواہش کی کمی جماع کی زیادتی کے بعد — کلیمیٹس۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی بوجہ نامردی — گریفائٹس ۔۳۰، ۲۰۰

☆ جنسی خواہش کی کمی + سُرعت انزال — لائیکوپوڈیم ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی مختلف اقسام کی الرجی کے باعث — ایپس میلی فیکا ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی + جنسی عمل کے دوران لذت نہ آئے — کینابس انڈیکا ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی رجنسی بے حسی کے باوجود انتشار — ہائیڈروفوبینم ۔۲۰۰

☆ جنسی خواہش کی کمی جماع کی طرف رغبت ہی نہ ہو — گریفائٹس ۔۳۰ ٹیوفرلیم Q۔

☆ جنسی خواہش کی کمی و طاقت مفقود — ایگنس کاسٹس کلاڈیم ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی جس کے ساتھ جماع سے نفرت ہو — سیپیا، گریفائٹس ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی موٹے اشخاص میں — کالی بائی کرام ۔۳۰

☆ جنسی خواہش کی کمی رجماع کی خواہش کبھی کم کبھی زیادہ — لائیکوپوڈیم ۔۳۰

## ۸۔ جماع کے بعد کی علامات

☆ جماع کے بعد غشی طاری ہو جائے — اگاریکس ۔۳۰، ڈجی ٹیلس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد تشنجی دورے پڑیں — بیوفو ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد پیدا شدہ تکالیف کے لیے — نکس وامیکا ۔۲۰۰، آرسینک ایلبم ۔۳۰

☆ جماع کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہو جائے — سی پیا ۔۳۰، ایمونیم کارب ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد کھانسی ہو — ٹیرنٹولا ہسپانیہ ۔۳۰

☆ جماع کے بعد دمہ ہو — ایسافوٹیڈا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد جاڑا سردی لگے — نیٹرم میور ۔۳۰

☆ جماع کے بعد ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو — نائٹرک ایسڈ ۔۳۰

☆ جماع کے بعد بخار ہو جائے — گریفائٹس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد پسینہ آئے — سی پیا ۔۳۰، گریفائٹس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد غنودگی آئے — سی لیشیا ۔۳۰، سی پیا ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد پراسٹیٹ گلینڈ میں درد — ایلم سیپا ۔۳۰



☆ جماع کے بعد مثانہ کے گرد درد — ایلم سیپا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہوں — گریفائٹس ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد جسمانی و آنکھوں کی کمزوری — کالی کارب ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد کمر میں جلن دار درد — میگنیشیا میور ۔۳۰

☆ جماع کے بعد یوریتھرا میں جلن و خارش — نیٹرم فاس ۔۳۰

☆ جماع کے دوران نیند آئے — لائیکوپوڈیم، براٹا کارب ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد سارے جسم میں خارش ہو — اگاریکس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد ٹانگوں میں درد ہو — ٹیوبرکولینم ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد ٹانگیں اور رانیں کانپیں — کلکیریا کارب ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد گھٹنوں میں کمزوری ہو — کلکیریا کارب ۔۲۰۰، سی پیا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہوں — گریفائٹس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد پنڈلیوں میں اینٹھن ہو — کالوسنتھس ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد جسم میں کوٹے پیٹے جانے کا احساس — سی لیشیا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد کمزوری لاحق ہو جائے — چائنا ۔X ۳، کلی نیم ۔۳۰

☆ جماع کے بعد خواہش جماع بڑھ جائے — نیٹرم میور ۔۳۰، ایسڈ فاس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد جوش و اکساہٹ پیدا ہو — کلکیریا کارب ۔۳۰

☆ جماع کے بعد بشاشت آجائے — نیٹرم میور ۔۳۰

☆ جماع کے بعد دماغی کمزوری ہو — سیکیلی کار ۔۳۰

☆ جماع کے بعد نظر کی کمزوری — کالی کارب ۔۲۰۰

☆ جماع کے بعد چکر آئیں — بووسٹا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد دانت کا درد — ڈفنی انڈیکا ۔۳۰

☆ جماع کے بعد پیشاب کی نالی میں درد و جلن — کینتھرس ۔۳۰

☆ جماع کے بعد سیون میں درد — ایلومینا ۔۳۰

| | |
|---|---|
| ☆ جماع کے بعد متلی و قے ہو | ماسکس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد تند مزاجی | سیلی نیم-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد کمر کا درد | کینابس انڈیکا' کالی کارب-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد تنفس میں دقت | سٹیفی سیگریا-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد چڑچڑاپن اور درد کمر | سیلی نیم-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد بے صبری پائی جائے | کلکیریا کارب-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد مریض بے حوصلہ ہو جائے | سی پیا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد بے ہوش ہو جائے | اگاریکس-۳۰' ڈجی ٹیلس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد بے چینی و گھبراہٹ ہو | کلکیریا کارب-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد پریشانی ہو | سی پیا-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد یکسوئی نہ رہے | ایسڈ فاس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد چڑچڑاپن پیدا ہو | سی لیشیا-۳۰' پٹرولیم-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد کنفیوژن اور دماغی کمزوری | بووسٹا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد کند ذہنی ہو جائے | سی پیا-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد چکر آئیں | ایسڈ فاس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد سر درد ہو | سی لیشیا-۳۰' سی پیا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد آنکھوں میں تناؤ ہو | سی لیشیا-۳۰' کلکیریا کارب-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد روشنی برداشت نہ ہو | کالی کارب-۲۰۰' چائنا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد آنکھوں میں درد ہو | نیٹرم میور-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد کانوں میں گھنٹیاں بجیں | ڈجی ٹیلس-3X |
| ☆ جماع کے بعد زبان میں لکنت پیدا ہو | سیڈران-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد دانتوں میں درد ہو | ڈیلفنی انڈیکا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد دانت درد کو افاقہ ہو | کیمفر-۳۰ |



| | |
|---|---|
| ☆ جماع کے بعد بھوک اڑ جائے | اگاریکس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد پیاس بہت لگے | یوجینیا-3X |
| ☆ جماع کے بعد پیٹ پر پسینہ آئے | اگاریکس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد زیر ناف درد ہو | ایلم سیپا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد کنج ران میں درد ہو | تھریڈان-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد مروڑ اٹھیں | نیٹرم فاس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد مقعد میں خارش ہو | اناکارڈیم-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد مقعد میں درد ہو | کاسٹی کم-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد مقعد میں جلن دار درد ہو | سی لیشیا-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد مقعد میں سوئیاں چبھنے کا سا درد | کلکیریا کارب-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد پیشاب رک جائے | ایسڈ فاس-Q |
| ☆ جماع کے بعد پیشاب میں جلن دار درد ہو | کاسٹی کم-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد ایستادگی ہو | سی پیا-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد عضو تناسل پر خارش ہو | لائیکوپوڈیم-۲۰۰ |
| ☆ جماع کے بعد کوتاہ دمی ہو | ڈجی ٹیلس-۳۰' سیڈران-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد معدے میں درد ہو | ایسڈ فاس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد قے ہو | ماسکس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد متلی ہو | کالی کارب-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد بھوک کی کمی ہو | اگاریکس-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد کمر میں جلن دار درد ہو | میگنیشیا میور-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد حشفہ کا چھل جانا | کلاڈیم-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد بائیں آنکھ کے اوپر درد | سیڈران-۳۰ |
| ☆ جماع کے بعد جسم میں گرمی کا احساس | گریفائٹس-۳۰ |

☆ جماع کے بعد تھکاوٹ — اگاریکس-۳۰

☆ جماع کے بعد پیشاب کی نالی میں جلن — کلکیریا کارب-۳۰

☆ جماع کے بعد پیشاب کی نالی میں خارش — نیٹرم فاس-۲۰۰

☆ جماع کے بعد غدہ مذی میں درد ہو — ایلم سیپا-۳۰

☆ جماع کے بعد حشفہ سکڑ جائے — کلاڈیم-۳۰

☆ جماع کے بعد عضو کئی دن تک ڈھیلا رہے — اگاریکس-۳۰

☆ جماع کے بعد منی کی تھیلیوں میں جلن ہو — کینتھرس-۳۰

☆ جماع کے بعد پسینہ آئے — گریفائٹس-۳۰

☆ جماع کے بعد پیشاب کا نہ رک سکنا — لائیکوپوڈیم-۳۰

☆ جماع کے بعد پیشاب ٹوٹی ہوئی دھار میں نکلے — ایسڈ فاس-۳۰

☆ جماع کے بعد کمزوری جو کئی دن تک رہے — کلکیریا کارب-۳۰

☆ جماع کے ایک دن بعد تکالیف آئیں — نیوفرلیوٹیم-۳۰

☆ جماع کے بعد سر کا دایاں حصہ مفلوج ہونے کا احساس — سی لیشیا-۳۰

☆ جماع کے بعد تمام تکالیف میں اضافہ ہو — اگاریکس-۳۰، کلکیریا کارب-۲۰۰

☆ جماع کے دوران عضو تناسل ڈھیلا رہے — سیلینیم-۱۰۰۰

☆ جماع کے بعد غشی کے دورے پڑیں — ایسافوئیڈا-۳۰

☆ جماع کے بعد بے چینی کاہلی اور کمزوری ہو — کلکیریا کارب

☆ جماع کے بعد افسردگی اور غم کا احساس ہو — نکس وامیکا-۳۰

## کثرتِ جماع کے بعد

☆ کثرت جماع کے باعث فالج کا عارضہ ہو — نیٹرم میور-۱۰۰۰

☆ کثرت جماع سے کمزوری ہو — ایسڈ فاس-۲۰۰

☆ کثرت جماع سے چہرہ بے رونق ہو — سٹیفی سیگریا-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد اعصابی کمزوری — اگاریکس-۳۰



☆ کثرت جماع کے بعد نسیان کا مرض ہو — ایسڈ فاس-۳۰، نیٹرم فاس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد پاگل پن ہو — کاکولس-۳۰، بیوفو-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد سر درد ہو — پلسٹیلا-۳۰، اگاریکس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد آنکھیں سُرخ ہوں — سٹافی سیگریا-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد آنکھیں کمزور ہوں — چائنا-۳۰، جیلسی میم-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد سماعت کمزور ہو جائے — پٹرولیم-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد خصیے سکڑ جائیں — سٹافی سیگریا-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے فوطہ پر خارش ہو — سٹافی سیگریا-۱۰۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد جلق کی رغبت ہو — کاربوویج-۳۰

☆ کثرت جماع سے نچلی کمر میں درد ہو — سٹافی سیگریا-۳۰، ایسڈ فاس-۳۰

☆ کثرت جماع سے پشت میں کھنچنے والا درد — آرسینکم ایلبم-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد ہاتھ و پاؤں بھاری ہوں — پلسٹیلا-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد ٹانگیں مفلوج ہو جائیں — رہسٹاکس-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد ٹانگوں میں کمزوری ہو — سٹافی سیگریا-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد ٹانگوں پر فالج گر جائے — نکس وامیکا-۳۰، فاسفورس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد چہرہ بے رونق ہو — سٹیفی سیگریا-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد بھوک کی کمی — ڈجی ٹیلس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد درد کمر — پلسٹیلا-۳۰، سٹیفی سیگریا-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد سردی لگنے کی رغبت — سٹیفی سیگریا-۲۰۰

☆ کثرت جماع کے بعد بہرہ پن — پٹرولیم-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد جماع کی خواہش — ایسڈ فاس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد ہاضمہ کی خرابیاں — ڈجی ٹیلس-۳۰

☆ کثرت جماع کے بعد پاگل پن یا مالیخولیا مرگی — فاسفورس

| | |
|---|---|
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد رات کے وقت تنفس میں دقت | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد کانوں میں جھنجھناہٹ | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد لاغری | سمبوکس نائیگرا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد اندھاپن | فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد آنکھوں میں چمک شدید | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد آنکھوں میں سُرخی | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد آنکھوں کا اندر دھنس جانا | سٹفی سیگریا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد بالوں کا گرنا | سٹفی سیگریا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد سر کا درد | پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد جسم سے گرمی کے شعلے نکلیں | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد حرارتِ غریزی کم ہو جانا | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ہسٹیریا | کونیم۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ٹانگوں میں کمزوری | سٹفی سیگریا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد جسم میں بھاری پن | پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد حافظہ کی کمزوری | سٹفی سیگریا، ہیکیلی کار۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ریڑھ کی خرابیاں | فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد اعصابی کمزوری | کوکا۔۳۰، فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد دل کی دھڑکن بڑھے | ڈجی ٹیلس۔۳۰، ہیکلیس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد فالج ہو | نیٹرم میور۔۳۰، نکس وامیکا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ٹانگوں کا فالج | نکس وامیکا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد دردِ قلب | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد کمی خون | پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد مریض خاموشی اختیار کرے | سٹفی سیگریا۔۳۰ |



| | |
|---|---|
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ہر طرح کی کمزوری کے لیے | نیٹرم میور۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد بدہضمی | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد بہرہ پن | پٹرولیم۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد کانوں میں گھنٹیاں بجیں | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد مرگی کے دورے | فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد سانس کی تنگی | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد جسمانی لاغری | سمبوکس۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد آنکھیں سُرخ ہوں | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد چکر آئیں | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد بال گریں | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد سر درد | پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد گدی میں درد | چائنا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد حرارتِ غریزی کی کمی | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ہسٹریا | کونیم۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ٹانگوں کی کمزوری | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ٹانگیں بھاری | پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد اعصابی کمزوری | فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد دھڑکن تیز ہو | ڈجی ٹیلس، ہیکیلی کار۔۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری | فاسفورس۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد منہ کا ذائقہ بدمزہ | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ کثرتِ جماع کے بعد کمزوری | اشی لاگو آرسینک ایلبم۔3x |

## ۹۔ جماع کے دوران کی علامات

| | |
|---|---|
| ☆ جماع کے دوران متلی ہو | سی پیئیا۔۳۰ |

☆ جماع کے دوران لطف نہ آئے — گریفائٹس۔۳۰

☆ جماع کے دوران تمام تکالیف میں اضافہ ہو — کلی نیم۔۳۰، سیپیا۔۳۰

☆ جماع کے دوران مقعد میں سکڑن یا جلن — مرک کار۔۳۰

☆ جماع کے دوران سو جائے — لائیکوپوڈیم۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران پنڈلیوں میں اینٹھن — گریفائٹس۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران گھٹنوں میں جلن — سلفر۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران تشنجی دورے — بیوفورانا۔۳۰

☆ جماع کے دوران انزال ولطف ندارد — کلاڈیم۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران منی خون آمیز خارج ہو — کاسٹی کم۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران جنگاسوں میں درد — تھیریڈیم۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران عضو ڈھیلا پڑ جائے — کیمفر۔۳۰

☆ جماع کے دوران عضو ڈھیلا پڑ جائے/انزال ندارد — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ جماع کے دوران مزہ نہ آئے — گریفائٹس۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران جھٹکے ندارد — اگاریکس۔۳۰

☆ جماع کے دوران جھٹکے کم — بربیرس، اڈیم، سی پیا۔۳۰

☆ جماع کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن — کینتھرس۔۳۰

☆ جماع کے دوران کھانے کی خواہش ہو — نیٹرم میور۔۳۰

☆ جماع کے دوران پیشاب کی نالی میں درد ہو — کینتھرس۔۳۰، سلفر۔۳۰

☆ جماع کے دوران عضو تناسل پر خارش ہو — سی پیا۔۳۰

☆ جماع کے دوران عضو تناسل پر گدگدی ہو — کلکیریا کارب۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران کوتاہ دمی ہو — امبرا گریسیا۔۳۰

☆ جماع کے دوران دل تیز دھڑکے — فاسفورس۔۳۰، ایسڈ فاس۔۳۰

☆ جماع کے دوران نیند آ جائے — لائیکوپوڈیم۔۲۰۰



☆ جماع کے دوران اینٹھن — گریفائٹس۔۳۰

☆ جماع کے دوران تشنج — بیوفو۔۳۰

☆ جماع کے دوران عضو کا یکایک ڈھیلا ہو جانا — کیمفر۔۳۰

☆ جماع کے دوران لذت ندارد — گریفائٹس۔۳۰

☆ جماع کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن — اگاریکس۔۳۰

☆ جماع کے دوران سیون میں دباؤ — ایلومینا۔۳۰

☆ جماع کے دوران پیشاب کی نالی میں تناؤ کا سا درد — ارجنٹم نائٹریکم۔۳۰

☆ جماع کے دوران عضو تناسل میں جلن — کریازوٹ۔۲۰۰

☆ جماع کے دوران پنڈلیوں میں اینٹھن ہو — گریفائٹس۔۲۰۰

## ۱۰۔ جریان

☆ جریان بچپن کی غلط کاریوں کے سبب — سٹافی سیگریا۔۲۰۰

☆ جریان جنسی مراق کی بدولت — ایسڈ فاس۔۳۰

☆ جریان رفع حاجت کے بعد — نائٹرک ایسڈ۔۳۰

☆ جریان رفع حاجت کے وقت زور لگانے سے — سی لیشیا۔۲۰۰، نکس وامیکا۔۲۰۰

☆ جریان ہاضمے کی خرابیوں کے سبب — نیٹرم فاس۔۳۰

☆ جریان کمی خون کے سبب — فیرم فاس۔۳۰

☆ جریان شدید جسمانی کمزوری کے سبب — ڈایاسکوریا۔۲۰۰

☆ جریان کثرت مباشرت کے سبب — ایگنس کاسٹس۔3x

☆ جریان مشت زنی اور اغلام بازی کے سبب — کلاڈیم۔۲۰۰، سلیکس نائیگرا۔۳۰

☆ جریان کثرت مباشرت کے سبب — فاسفورک ایسڈ۔۳۰، سٹیفی سیگریا۔۲۰

☆ جریان افسردہ اور مایوس مریض — زنکم میٹ۔۲۰۰

☆ جریان مریض کی طبیعت غمزدہ ہو اور کمر درد ہو — کالی بروم۔۳۰

☆ جریان مریض کو بہت زیادہ کمزور کر دے — کلکیریا فاس۔6x

☆ جریان چلتے پھرتے    کلی نیم ۳۰

☆ جریان بوس وکنار کے دوران    ایگنس کاسٹس۔۳۰، کونیم۔۳۰

☆ جریان کے سبب نظر کمزور ہو جائے    کالی کارب۔۳۰

☆ جریان کے سبب یادداشت کمزور ہو جائے    انا کارڈیم۔۳۰

☆ جریان کے سبب نامردی ہو جائے    ڈامیانہ۔Q

☆ جریان جنسی خواہشات کی کثرت کے سبب    سیلکس نائیگرا۔۳۰

☆ جریان کے باعث بال سفید ہو جائیں    ایسڈ فاس۔3X

☆ جریان کے باعث شدید جسمانی کمزوری    چائنا۔۳۰

☆ جریان کے باعث چکر آئیں اور سر درد ہو    نیٹرم میور۔۳۰

☆ جریان عام جسمانی کمزوری کے ساتھ    چائنا۔۳۰

☆ جریان جب کہ منی کی رنگت سبزی مائل ہو    تھوجا۔۱۰۰۰

☆ جریان جس کے ساتھ دل کی غیر معمولی دھڑکن    ڈی جی ٹیلس۔۳۰

☆ جریان سوزاک کے باعث    کینتھرس۔۳۰

☆ جریان قبض کے سبب    ایلومینا۔۳۰

☆ جریان معمولی سی جنسی تحریش سے بھی    زنکم میٹ۔۳۰

☆ جریان چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے    سیلی نیم۔۳۰

☆ جریان ایستادگی کے ساتھ مذی رمنی خارج ہو جائے    پلساٹیلا۔۱۰۰۰

☆ جریان نیند کے دوران مذی رمنی خارج ہوتی رہے    ایسکیولس ہپ۔۳۰

☆ جریان معمولی سی اکساہٹ سے    آرنیکا۔۲۰۰

☆ جریان شہوانی خیالات کے ساتھ    کاسٹی کم۔۲۰۰

## ۱۱۔ جلق

☆ جلق کی نہ رکنے والی خواہش    اشی لاگو۔۳۰

☆ جلق کی رغبت نیند کے دوران    تھوجا۔۳۰، ۲۰۰



☆ جلق بچوں کی    میڈورینم۔۲۰۰

☆ جلق کے باوجود رات کو احتلام ہو    سی لیشیا۔ڈی جی ٹیلس۔فاسفورس۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے بعد جریان ہو    ایلومینا۔ارجنٹم نائٹریکم۔چائنا۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث نامردی    ارجنٹم نائٹریکم۔ایسڈ فاس۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث ایستادگی ختم ہو جائے    جیلسی میم۔گریفائٹس۔کالی کارب۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث جماع سے نفرت    کالی برومم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث غدہ قدامیہ میں درد    نیٹرم میور۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث خصیے سکڑ جائیں    میفا ئیٹس۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث انتشار تکلیف دہ    ارجنٹم نائٹریکم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث جسم ہلکا محسوس ہو    جیلسی میم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث جسم کمزور ہو جائے    نیٹرم میور۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث سستی اور کاہلی ہو جائے    ڈی جی ٹیلس۔جیل۔۳۰، ۲۰۰سی میم

☆ جلق کے باعث فالج ہو جائے    چائنا۔اسٹینم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث اعصابی تکالیف ہوں    کالی فاس۔جیلسی میم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث یرقان ہو جائے    چائنا۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث ہسٹریا ہو جائے    ریفینس۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث ذہنی کمزوری ہو جائے    اوری گینم۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث کیل نکلیں    کروٹیلس۔فاسفورک ایسڈ۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث ہاضمہ خراب ہو جائے    برائنا کارب۔نکس وامیکا۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث دل کی تکالیف ہو جائیں    برائنا کارب۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث درد کمر ہو    نکس وامیکا۔فاسفورک ایسڈ۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث کمر اور کولہوں کے جوڑ کی کمزوری    نکس وامیکا۔۳۰، ۲۰۰

☆ جلق کے باعث اندھاپن ہو جائے    فاسفورک ایسڈ۔۳۰، ۲۰۰

| | |
|---|---|
| جلق کے باعث آنکھوں میں درد ہو | سائنا۔۳۰' ۲۰۰ |
| جلق کے باعث درد سر ہو | برائی اونیا۔کلکیریا کارب۔ سلفر۔۳۰' ۲۰۰ |
| جلق کے باعث سینہ میں درد ہو | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| جلق کے باعث سینہ میں اینٹھن ہو | ایسڈ فاس۔۳۰ |
| جلق کے باعث رعشہ ہو | کلکیریا کارب۔۲۰۰' چائنا۔۳۰ |
| جلق کے باعث قبض ہو | لائیکوپوڈیم' نکس وامیکا۔۲۰۰ |
| جلق کے باعث پاگل پن | اوپیم۔۲۰۰ |
| جلق کے باعث کند ذہنی' رنجی ہو | سٹیفی سیگریا۔۲۰۰ |
| جلق کے باعث مرگی کے دورے | کیلیس۔۲۰۰' سٹرامونیم۔۳۰ |
| جلق کے باعث آنکھوں کی کمزوری | سائنا۔۳۰ |
| جلق کے باعث چہرہ کا عصبی درد | آرم میٹ۔۳۰ |
| جلق کے باعث پھیپھڑوں سے خون آئے | کونیم۔۳۰ |
| جلق کے باعث مالیخولیا ہو | نیٹرم نیولا' آرم میٹ۔۳۰ |
| جلق کے باعث عارضی نامردی | سٹرامونیم۔۲۰۰ |
| جلق کے باعث عدم توجہی | سٹیفی سیگریا۔۲۰۰ |
| جلق کے باعث ریڑھ میں تحریک ہو | پلساٹیلا۔۳۰ |
| جلق کے باعث تھکاوٹ اور دماغی کمزوری | جیلسی میم۔۳۰ |
| جلق کے باعث بے وقوفانہ فہمی | نیٹرم نیولا۔۳۰ |
| جلق کے باعث ٹانگوں میں کمزوری | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| جلق کے باعث ٹانگیں مفلوج ہوں | نیٹرم میور۔۳۰ |
| جلق کے باعث پست ہمتی | سٹیفی سیگریا۔۳۰ |
| جلق کے باعث دماغی خرابی ہو | پلمبم میٹ۔۳۰ |
| جلق کے باعث فالج ہو | چائنا' سٹانم۔۳۰ |



| | | |
|---|---|---|
| ☆ | جلق کے باعث اعصابی کمزوری | فاسفورس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث ذہنی پستی | پلاٹینا۔۲۰۰ |
| ☆ | جلق کے باعث چہرے پر کیل نکلیں | ایسڈ فاس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث جسم ڈھیلا ڈھالا ہو | سی پیا۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث افسوس کرے | سٹافی سیگریا |
| ☆ | جلق کے باعث مایوسی پیدا ہو | اوپیم |
| ☆ | جلق کے باعث جُرم کا احساس ہو | فاسفورک ایسڈ |
| ☆ | جلق کے باعث بھولنے کی عادت ہو جائے | پلاٹینا۔سٹیفی سیگریا |
| ☆ | جلق کے باعث چڑچڑا پن ہو جائے | ہائیوسائمس |
| ☆ | جلق کے باعث پاگل پن ہو | ایگنس کاسٹس۔کلکیریا فاس |
| ☆ | جلق کے باعث یکسوئی نہ ہو سکے | ایوینا سٹائیوا |
| ☆ | جلق کے باعث منی پتلی ہو جائے | ایوینا سٹائیوا۔Q |
| ☆ | جلق کے باعث ذہنی کمزوری ہو | اینا کارڈیم۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث کام سے نفرت ہو | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث مرگی کے دورے پڑیں | کیلیس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث دل کی تکالیف ہوں | ڈجی ٹیلس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث سُرعت انزال | یوہم بنم۔Q |
| ☆ | جلق کے باعث مختلف عوارض ہوں | سٹیفی سیگریا۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث چہرے بے رونق ہو | سٹیفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ | جلق کے باعث مریض افسردہ ہو | ایسڈ فاس۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث تشنجی دورے پڑیں | پلاٹینا۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث جریان و نامردی | یپوفورانا۔۳۰ |
| ☆ | جلق کے باعث عضو میں خرابیاں | آرنیکا۔۳۰' ۲۰۰ |

| | |
|---|---|
| ☆ جلق کے باعث عضوِ تناسل سکڑ جائے | لائیکو پوڈیم۔۲۰۰ |
| ☆ جلق کی نہ رُکنے والی خواہش شہوانی خیالات کے آتے ہی | کلکیریا کارب۔۲۰۰ |
| ☆ جلق کی خواہش جس کے ساتھ اعضائے تناسل ذکی الحس ہوں | کوکولس۔۳۰ |
| ☆ جلق جس کے ساتھ مریض کو ننگا ہونے کی خواہش ہو | ہائیوسائمس۔۳۰ |
| ☆ جلق کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش | پلاٹینا۔۲۰۰ |

## ۱۲۔ حشفہ

| | |
|---|---|
| ☆ حشفہ سُن ہو | بربیرس۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر ٹھنڈک کا احساس | اگنوسموڈیم۔۲۰۰ |
| ☆ حشفہ پر برفیلی ٹھنڈک کا احساس | سلفر۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر ٹھنڈک + سکڑ جائے | مرکیورس۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر خارش + مواد خارج ہو | سناباریس۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر خارش | کاسٹیکم۔۲۰۰ |
| ☆ حشفہ پر خارش (رات کو) | آرم میور۔x۳ |
| ☆ حشفہ پر خارش + مسلنے کی خواہش | کالی بائیکرم۔۳۰ |
| ☆ حشفہ کے سرے پر خارش | میزیریم۔۳۰ |
| ☆ حشفہ کے سرے پر خارش، پیشاب کے بعد | سپونجیا۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر درد (پیرانی موسس) | رہس ٹاکس۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر درد + پیشاب کرنے کی حاجت | آرم میٹ، فیرم فاس، لائیکو۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر درد + پیشاب سے پہلے | کینتھرس، لائیکو پوڈیم۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر درد + پیشاب کے دوران | ایکونائٹ، اناکارڈیم، کاسکارا۔۳۰ |
| ☆ حشفہ پر درد + پیشاب کے بعد | اناکارڈیم، لائیکو پوڈیم، پلساٹیلا۔۳۰ |
| ☆ حشفہ سرخ + انفیکشن | سارساپریلا۔۳۰ |
| ☆ حشفہ سرخ + چمک دار | رہس ٹاکس۔۳۰ |



| | |
|---|---|
| ☆ حشفہ سرخ + سوجن | کینابس سٹائیوا۔۳۰ |
| ☆ حشفہ سرخ + مسلنے کی خواہش | کلاڈیم۔۳۰ |
| ☆ حشفہ ذکی الحس + چھونے سے پُر درد | مرک کار۔۳۰ |

## ۱۳۔ خصیے

| | |
|---|---|
| ☆ خصیے تھیلی میں نہ اتریں | زنکم میٹ۔۳۰، تھائیروڈینم۔x۳ |
| ☆ خصیوں میں درد انزال منی کے بعد | کیپ سیکم۔۳۰ |
| ☆ خصیے نارمل سائز سے چھوٹے ہوں | آئیوڈیم۔۳۰ |
| ☆ خصیوں میں درد جو حرکت یا چھونے سے بڑھ جائے | ایسافوٹیڈا۔۳۰ |
| ☆ خصیوں میں درد جس کے ساتھ سوجن پائی جائے | آرم میٹ۔۳۰ |
| ☆ خصیوں میں درد جو سوجن یا سوجن کے بغیر ہو | پلساٹیلا۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں میں کھنچنے اور دبانے والے درد | بربیرس ولگیرس۔۳۰ |
| ☆ خصیوں میں شدید درد بالخصوص دائیں طرف | بسمتھ۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں میں درد اور سوجن | ہیمامیلس۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کی سوجن، درد اور سختی نمایاں ہو | آئیوڈیم۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کی ذکی الحسی، مریض خود بھی نہ چھو سکے | نکس وامیکا۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں میں درد جو عضو تناسل تک جائے | نیوفرلیوٹیم۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جس کے ساتھ ایک خصیہ سُوکھ جائے | تھوجا۔۱۰۰۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو جماع کے بعد زیادہ ہو | آئیوڈیم۔۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو انزال کے وقت ہو | ایسڈ فاس۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو سوزاک کے دب جانے سے لاحق ہو | نیٹرم میور۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو کن پیڑوں کے دب جانے سے لاحق ہو | نیٹرم میور۔۳۰، ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو صبح کے وقت ہو | سارساپریلا۔۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو دوپہر میں ہو | کاسٹیکم، اسٹی لاگو۔۳۰ |

| | |
|---|---|
| ☆ خصیوں کا درد جو شام کو ہو | چنی نم سلف۔ 3x |
| ☆ خصیوں کا درد جس کے ساتھ خواہش نفسانی | آئیوڈیم' سٹفی سیگریا۔ ۳۰' ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو دائیں طرف ہو | بسمتھ' کلکیریا کارب' کاٹی کم' چنی نم سلف' نیٹرم میور۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو بائیں طرف ہو | کونیم' جنجر' وفائیو فریلوٹیم' سمبوکس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا درد جو چلتے وقت ہو | سٹفی سیگریا' سمبوکس' تھوجا۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں پر چوٹ لگنے کے بعد ہونے والا درد | سٹائی سیگریا۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں میں درد بالخصوص بائیں طرف جو ہاتھ لگانے سے زیادہ ہو | سٹائی سیگریا۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کے سوکھنے کی لاجواب دوا | آرم میٹ۔ ۱۰۰۰ |
| ☆ خصیوں کے سوکھنے کی مجرب دوا | چمافیلا۔ Q' آئیوڈیم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا جس کے ساتھ درد ہو | کیپ سیکم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا جس کے ساتھ نامردی ہو | کاربونیم سلف۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا پہلے دایاں پھر بایاں | لائی سین۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھ کر پیچھے کی طرف کھنچ جانا | پلمبم میٹ۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا کثرت جماع کے بعد | سٹفی سیگریا۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا کثرت جلق کے بعد | میفائٹس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا کثرت جریان کے بعد | جیلسی میم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کا سوکھنا جس کے ساتھ درد ہو | زنکم میٹ۔ ۳۰ |

## ۱۴۔ خصیوں کی تھیلی / سکروٹم

| | |
|---|---|
| ☆ خصیوں کی تھیلی سے خون نکلے | پیٹرولیم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی نیلی ہو جائے بڑوں میں | ایمائی گیلس۔ 3x |
| ☆ خصیوں کی تھیلی نیلی ہو جائے بچوں میں | آرسینک البم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر دانے نکلیں | کیو پرم آرس۔ ۳۰ |



| | |
|---|---|
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش اور درد | کالی کارب۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر جلن اور حدت محسوس ہو | سپونجیا۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر جلن جس کے ساتھ ہرپیز ہو | کلکیریا کارب۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی اور رانوں کے درمیان خارش | برائٹا کارب۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر شیو کرنے کے بعد خارش | نیٹرم سلف۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ٹھنڈی ہو جب کہ عضو سکڑ جائے | ایلوز۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ٹھنڈک کا احساس | برومیم' بربیرس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ٹھنڈک اور نامردی | کیپ سیکم۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ٹھنڈک اور اعضائے تناسل ڈھیلے | ڈایاسکوریا۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ٹھنڈک اور اعضائے تناسل پر خارش ہو | آئیرس ورس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی میں بھراؤ کا احساس ہو | کالوسنتھس۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ایگزیما | کروٹیلس۔ ۳۰' ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر ہرپیز | نیٹرم میور۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش رات کے وقت | کالاڈیم۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سوراسس | نائٹرک ایسڈ' تھوجا۔ ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سُرخ رنگ کے دانے نکلیں | ایسڈ فاس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سُرخ باد | پٹرولیم' رہسٹاکس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی سُرخ اور کٹی پھٹی ہو | چیلی ڈونیم۔ ۳۰' ۲۰۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی میں بھرے ہونے کا احساس | ایسڈ فلور۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی میں گرمی کا احساس ہو | سپونجیا' ایسڈ سلف۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی گرمی کا احساس بالخصوص بائیں طرف | نکس وامیکا۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی میں گرمی کا احساس دونوں طرف | سمبوکس۔ ۳۰ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش ہو | ایلومینا' میفائٹس' رسٹس۔ ۳۰ |

| | |
|---|---|
| ☆ خصیوں کی تھیلی کی سائیڈوں پر خارش ہو | اگاریکس' پٹرم کروڈم ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو رات کو زیادہ ہو | کلاڈیم ۔ ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سوجن اور ناقابل برداشت خارش | رہسٹاکس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو رات کو بستر پر زیادہ ہو | سلفر ۔ ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو شام کے وقت ہو | ایلومینا ۔ ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو صبح کے وقت ہو | کوکولس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو دوپہر میں ہو | ٹیلوریم ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش (گنوریا کے سبب) | مرکیورس ۔ ٣٠' ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو چھوٹے چھوٹے حصوں پر ہو | نکولس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو سیون تک جائے | سارساپریلا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر شدید خارش جو رات کو جگا دے | اریکا ارینس ۔ 3x' |
| | کروٹن ٹگ ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جس کے ساتھ ایستادگیاں ہوں | کالی میور ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو کثرت جماع کے سبب ہو | سٹیفی سیگریا ۔ ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ کی کثرت ہو | کلکیریا فاس' اگنیشیا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جو بدبودار ہو | ڈایاسکوریا' آئیوڈیم' سلفر ۔ ٣٠' ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جو رات کو زیادہ ہو | ہیمامیلس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جو چلتے وقت زیادہ ہو | مرکیورس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جو صبح کے وقت ہو | اسی لاگو 3x |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جو شام کے وقت زیادہ ہو | نیٹرم سلف ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر پسینہ جس کے ساتھ جیسے سکڑ جائیں | روڈوڈینڈران ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی ہو | کلاڈیم' سٹیفی سیگریا ۔ ٢٠٠ |



| | |
|---|---|
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی اور ٹھنڈی ہو | ڈایاسکوریا' جیلسیمیم' |
| | لائیکوپوڈیم ۔ ٣٠' ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی جس کے ساتھ خارش ہو | نیٹرم میور ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی جب کہ عضو کھنچا ہوا | نیوفرلیوٹیم ۔ 3x |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی جس کے ساتھ گرمی کا احساس | پلساٹیلا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی ڈھیلی ڈھالی اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے | اسی لاگو ۔ 3x |
| ☆ خصیوں کی تھیلی انتہائی ذکی الحس ہو | ایپس میلی فیکا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی کو چھوا جانا برداشت نہ ہو | کالی کارب' نیٹرم میور' |
| | ایسٹرفاس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سرخ نشانات ہوں | ری لیشیا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سفید رنگ کے نشانات ہوں | مرکیورس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر سبزی مائل پیلے نشانات | ایمانی گیلس ۔ 3x |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر السر ہو | نائٹرک ایسڈ' سی پیا ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر السر اور چھالے ہوں | کیوپرم آرس ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر السر گنوریا کے بعد | آرم میٹ ۔ ٢٠٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر السر سفلس کے بعد | کالی آئیوڈائڈ ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی رفوطہ سن ہو | کیپ سیکم' نیٹرم کارب ۔ ٣٠ |
| ☆ خصیوں کی تھیلی پر خارش جو بائیں طرف ہو اور مریض اس جگہ کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان لے کر ملے | سٹیفی سیگریا ۔ ٢٠٠ |

## ١٥۔ سُرعت انزال

| | |
|---|---|
| ☆ سُرعت انزال نفسانی خواہشات کی زیادتی کے باعث | سلیکس نائیگرا ۔ ٣٠ |
| ☆ سُرعت انزال/ایستادگی ہوتے ہی | سلی نیم ۔ ٢٠٠ |
| ☆ سُرعت انزال/ایستادگی سے قبل ہی | سلفر ۔ ٢٠٠ |

- ☆ سُرعت انزال جنس مخالف سے بغل گیر ہوتے ہی — زنکم میٹ۔۳۰
- ☆ سُرعت انزال جنس مخالف کو دیکھتے ہی — کونیم۔۲۰۰
- ☆ سُرعت انزال بوس وکنار کرتے ہوئے — میوریکس۔۳۰
- ☆ سُرعت انزال دورانِ جماع ہر بار — ٹائٹینم۔۳x
- ☆ سُرعت انزال جماع کی خواہش سے ہی — کونیم۔۲۰۰
- ☆ سُرعت انزال کے ہر کیس کے لیے مجرب دوا — یوہم بینم۔۳x

## ۱۶۔ سوزاک

- ☆ سوزاک کی عمومی دوا — کینتھرس۔۳۰
- ☆ سوزاک کے ہر درجے کی خاص دوا — وسکی کیریا کیونس۔Q
- ☆ سوزاک کے پہلے درجہ کی دوا — مرکسال۔۳' کالی میور۔۲۰۰
- ☆ سوزاک کا پہلا درجہ جب کہ مواد کا اخراج کم ہو — جیلسی میم۔1x
- ☆ سوزاک کے دوسرے درجے کی خاص دوا — ہائیڈراسٹس۔Q'
- ☆ پرانا سوزاک جب کہ مواد کا اخراج زیادہ ہو — پچی۔Q
- ☆ بگڑا ہوا سوزاک جو کسی طرح ٹھیک نہ ہو رہا ہو — ہیپر سلف۔Q
- ☆ سوزاک جس کے ساتھ گھونگھٹ میں ورم اور جلن ہو — یکا فلامنٹوسا۔Q
- ☆ سوزاک کے باعث نسوں میں درد ہو — تھوجا۔1X
- ☆ سوزاک کے بعد نالی میں گانٹھیں بن جائیں — ٹیوکریم میریم ویرم۔1X
- ☆ بار بار لاحق ہونے والا سوزاک — ایگنس کاسٹس۔Q
- ☆ سوزاک کے آخری درجے کی بہترین دوا — سینی شیو آرس۔ Q
- ☆ مریض ٹانگیں چوڑی کر کے چلنے پر مجبور ہو — کینابس سٹائیوا۔Q
- ☆ عضو میں سرسراہٹ ہو لیکن مواد خارج نہ ہو — سی پیا۔۳۰
- ☆ جب زخم پک جائے اور ورم ہو جائے — کینابس سٹائیوا۔۳۰
- ☆ ثانوی درجہ میں مستعمل دوا — مرکیورس ویو۔1X



- ☆ سوزاک کے ہر درجے میں شافی دوا — کیوبیبا۔۳x
- ☆ رات کو پُر درد ایستادگیوں کی زیادتی ہو — کینابس سٹائیوا۔Q
- ☆ پیشاب کی نالی میں تنگی پائی جائے — ایکونائٹ۔ جیلسی میم۔۳۰
- ☆ پُرانے سوزاک کی بہترین دوا — نیٹرم میور۔۲۰۰
- ☆ پتلا سوزاکی مواد خارج ہو — کلکیریا فاس۔۶x
- ☆ گاڑھا زرد یا سبزی مائل مواد خارج ہو — پلساٹیلا۔1x
- ☆ زردی مائل سبز مواد خارج ہو — کالی سلف۔۲۰۰
- ☆ پیشاب کی نالی میں سوزش اور خارش — پیٹروسیلینم۔Q

## ۱۷۔ ضعفِ باہ/نامردگی

- ☆ ضعفِ باہ ذیابیطس کی وجہ سے — ماسکس۔۳۰' کیوپرم میٹ۔۲۰۰
- ☆ ضعفِ باہ اعصابی کمزوری کے باعث — یوہم بینم۔Q
- ☆ ضعفِ باہ کسی چوٹ کے سبب — آرنیکا۔۱۰۰۰' ہائپریکم۔۲۰۰
- ☆ ضعفِ باہ متعدی جنسی مرض کے سبب — مرکیورس۔۳۰' کالی آیوڈائڈ۔۳۰
- ☆ ضعفِ باہ جنسی خواہش کے دبنے سے — چی نیم۔x ۶' کونیم۔۲۰۰
- ☆ ضعفِ باہ کے مریضوں کے لیے جنسی ٹانک — ڈامیانہ۔Q
- ☆ ضعفِ باہ آتشک کے باعث — مرک سال۔۳۰
- ☆ ضعفِ باہ سوزاک کے باعث — ایگنس کاسٹس۔۳۰۔۱۰۰۰
- ☆ ضعفِ باہ کثرت عیاشی کے سبب — کلاڈیم۔۳۰' نکس وامیکا۔۳۰
- ☆ ضعفِ باہ دل کے عارضے کے ساتھ — جیلسی میم۔۳۰
- ☆ ضعفِ باہ خصیوں کے سکڑنے کے سبب — سیبل سیرولاٹا۔۳۰
- ☆ ضعفِ باہ جلق کے سبب — ایسڈ فاس۔۳x
- ☆ ضعفِ باہ کثرتِ جماع کے سبب — فاسفورس۔۱۰۰۰
- ☆ ضعفِ باہ نفسانی خواہشات کی زیادتی کے ساتھ — ڈجی ٹیلس' اگنیشیا' چائنا۔۳۰

☆ ضعفِ باہ ناک کے نزلہ کے ساتھ — لائیکوپوڈیم۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ کلورین کے زہر کے سبب — لائیکوپوڈیم۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ جماع سے نفرت کے ساتھ — گریفائٹس۔۳۰

☆ ضعفِ باہ پست ہمتی کے ساتھ — سپونجیا۔۳۰

☆ ضعفِ باہ سپاری کی سوجن کی وجہ سے — پولی گونم۔۳x

☆ ضعفِ باہ مزمن سوزاک کے ساتھ — ایگنس کاسٹس۔۳۰

☆ ضعفِ باہ سوزاک کے دب جانے سے — تھوجا۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ ٹانگوں میں کمزوری کے ساتھ — سنامومم۔۳۰

☆ ضعفِ باہ کولہے میں درد کے ساتھ — کوکس کیکٹائی۔۳۰

☆ ضعفِ باہ مالیخولیا کے ساتھ — کالی برومیٹم۔۳۰

☆ ضعفِ باہ خواہشات کے روکنے کے بعد — فاسفورس۔۳۰، کونیم۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری کے ساتھ — نکس وامیکا۔۳۰

☆ ضعفِ باہ درد سر حس کے ساتھ — نیوفرلیوٹیم۔۳۰

☆ ضعفِ باہ ہائیڈروسیل کے ساتھ — فاسفورس۔۳۰

☆ ضعفِ باہ بوڑھے لوگوں کے لیے — لائیکوپوڈیم۔۱۰۰۰

☆ ضعفِ باہ نوجوانوں کے لیے — ایگنس کاسٹس۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ کے سبب جماع سے نفرت پیدا ہو جائے — گریفائٹس۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ مجرد رہنے کے سبب — کونیم۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ کے سبب کاہلی اور سستی غالب ہو — کلکیریا کارب۔۳۰

☆ ضعفِ باہ جماع کی خواہش ہو لیکن قوت نہ ہو — کلاڈیم۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ خواہش زیادہ لیکن عملی طور پر نامردی ہو — سی پیا۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے نامردی — برائٹا کارب۔۳۰

☆ ضعفِ باہ عضو تناسل کی شدید کمزوری کے سبب — جلیسی میم۔۳۰



☆ ضعفِ باہ مثانہ اور پیشاب کی نالی میں تحریک کے ساتھ — سٹیفی سیگریا۔۲۰۰

☆ ضعفِ باہ ہر قسم کا — کلکیریا فاس۔ نیٹرم فاس۔ کالی فاس۔۶x

## ۱۸۔ عضوِ تناسل

☆ عضو تناسل تک ہاتھ لے جانے کا رجحان ہو — بیوفورانا۔۳x

☆ عضو تناسل چھوٹا اور ٹھنڈا ہو جائے — ایگنس کاسٹس۔۳۰

☆ عضو تناسل پیچھے کی جانب کھنچ جائے — نیوفرلوٹیم۔Q

☆ عضو تناسل کا اگلا حصہ سن محسوس ہو — سباڈیلا۔۳۰

☆ عضو تناسل کے اگلے حصے پر خارش ہو — پٹرولیم۔۳۰

☆ عضو تناسل پر خارش ہو — مرک سال

☆ عضو تناسل لوتھڑے کی مانند اور پلپلا — کلاڈیم۔۳۰

☆ عضو تناسل کمزور ہو جس کی وجہ سے جنسی خواہش نہ پیدا ہو — پکرک ایسڈ۔۳۰

☆ عضو تناسل کی شدید خارش ہو — کروٹن ٹگ۔۳۰

☆ عضو تناسل پر مسوکے ہوں — سنابیرس۔۳۰

☆ عضو تناسل میں انتشار کم ہو — یوہم بینم۔۳x

☆ عضو تناسل میں کم انتشار کے لیے مجرب دوا — یوہم بینم۔۳x

☆ عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پلپلا ہو — کلاڈیم۔۳۰، ایگنس کاسٹس۔۳x، لائیکوپوڈیم۔۲۰۰، سلفر۔۳۰

☆ عضو سرد ہو اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے — کلاڈیم۔۲۰۰

☆ عضو چھوہارے کی مانند سکڑا ہوا لیکن ایستادگی کے وقت صحیح ہو — ماسکس۔۳۰

☆ عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کھچا ہوا — اگنیشیا۔۳۰

☆ عضو ڈھیلا اور سر جھکا ہوا — سٹیفی سیگریا۔۲۰۰

- ☆ عضو کی ایستادگی صرف ملنے یا دبانے پر ہو — میور یکس۔۳۰، ٹیکیم نم۔۲۰۰، چائنا۔3x
- ☆ عضو بالکل سکڑ جائے — بربیرس ولگیرس۔۳۰
- ☆ عضو مرجھایا ہوا اور سکڑا ہوا — کیناابس انڈیکا۔۳۰
- ☆ عضو سکڑ جائے اور خصیے ٹھنڈے ہوں رات کے وقت — ایلوز۔۳۰
- ☆ عضو میں ورمی کیفیت ہو چلتے وقت — کیناابس سٹائیوا۔۳۰
- ☆ عضو میں جلن ہو جماع کے بعد — لائیکوپوڈیم۔۳۰
- ☆ عضو کی جڑ میں درد ہو صبح جاگنے پر — کالی بائیکروم۔۳۰
- ☆ عضو کے اگلا سرا سُن ہو — فاسفورک ایسڈ۔۳۰
- ☆ عضو (مکمل) سُن ہو — مرکیورس۔۳۰
- ☆ عضو سُن ہو (صبح کے وقت) ایستادگی موجود ہو — ایمبر اگریسیا۔۳۰
- ☆ عضو سُن ہو سیڑھیاں اُترتے وقت — فارمیکا رُوفا۔۳۰
- ☆ عضو موجود ہی نہیں ہے (احساس) — کوکین۔۳۰
- ☆ عضو قبل از وقت نشوونما پائے — پلاٹینا۔۳۰
- ☆ عضو کی الکس ہو جائے — کوکولس انڈیکا، کروٹن ٹگ، تھوجا۔۳۰
- ☆ عضو کسی سے بندھا ہوا ہے (احساس) — پلمبم میٹ۔۳۰
- ☆ عضو پر پسینہ کثرت سے آئے — نیٹرم میور، نائٹرک ایسڈ۔۳۰
- ☆ عضو سُوجا ہوا اور متورم ہو — کلاڈیم۔۳۰
- ☆ عضو پر خارش ہو — ایکونائٹ، کلاڈیم، کینتھرس۔۳۰
- ☆ عضو کی ورمی کیفیت — لیڈم پال۔۲۰۰
- ☆ عضو سوج جائے جماع کے بعد — کریازوٹ۔۲۰۰



- ☆ عضو میں دُکھن کا احساس — آرنیکا۔۲۰۰
- ☆ عضو میں درد ہو — بینزوئک ایسڈ۔۳۰
- ☆ عضو میں شدید درد جو فوطہ تک جائے — کونیم۔۲۰۰
- ☆ عضو ٹھنڈا اور پلپلا — ڈایاسکوریا۔۲۰۰
- ☆ عضو ٹھنڈا اور پلپلا + پسینہ — یورینیم نائٹریکم۔۳۰
- ☆ عضو کی الکس ہو — وریٹرم البم۔۳۰
- ☆ عضو کی کمزوری جماع کے بعد — بربیرس۔۳۰
- ☆ عضو کی تھکاوٹ پیشاب کرنے کے بعد — کلکیریا فاس۔۳۰
- ☆ عضو میں جلن کا احساس — کلکیریا کارب، مرکیورس ڈل۔۳۰
- ☆ عضو سے بو آئے — نیٹرم میور۔۳۰
- ☆ عضو پر پسینہ جو بدبودار ہو — فلورک ایسڈ۔۳۰
- ☆ عضو میں ورمی کیفیت ہو چلتے وقت — کیناابس سٹائیوا۔۳۰
- ☆ عضو میں جلن ہو جماع کے بعد — لائیکوپوڈیم۔۳۰
- ☆ عضو کی جڑ میں درد ہو صبح جاگنے پر — کالی بائیکروم۔۳۰
- ☆ اعضائے تناسل سُن ہوں — گریفائٹس۔۲۰۰

## ۱۹۔ مادہ منویہ / مادہ تولید

- ☆ مادہ منویہ میں سپرمز کی کمی ہو — ڈامیانہ۔3x
- ☆ مادہ منویہ انتہائی پتلا ہو — سیلی نیم۔3x
- ☆ مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو — سلی نیم، ٹائی ٹینم، سی پیا۔۲۰۰
- ☆ مادہ منویہ خونی ہو — لائیکوپوڈیم، فلورک ایسڈ۔۳۰
- ☆ مادہ منویہ تیز بو والا ہو — لیکسس۔۲۰۰
- ☆ مادہ منویہ کی بو گندے پیشاب کی مانند ہو — نیٹرم فاس۔۳۰
- ☆ مادہ منویہ کی بو غیر قدرتی ہو — سیلی نیم۔۳۰

| | |
|---|---|
| ☆ مادہ منویہ گرم ہو | کلکیریا کارب' ٹیرنٹولا کیوبنس' اگاریکس۔۳۰'۲۰۰ |
| ☆ مادہ منویہ ٹھنڈا ہو | نیٹرم میور۔۳۰ |
| ☆ مادہ منویہ جلن دار ہو | کلکیریا کارب۔۲۰۰ |
| ☆ مادہ منویہ بکثرت خارج ہو | نکس وامیکا' سٹیفی سیگریا' زنجبر۔۳۰'۲۰۰ |
| ☆ مادہ منویہ کم مقدار میں خارج ہو | ایلوز براٹا کارب۔۳۰'۲۰۰ |
| ☆ مادہ منویہ کم مقدار + دیر سے خارج ہو | اگاریکس۔۳۰ |
| ☆ مادہ منویہ کم مقدار میں یا خارج نہ ہو | لائی سین۔۳۰ |
| ☆ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو | کیناباس سٹائیوا۔۳۰' کینتھرس۔۳۰ |
| ☆ مادہ منویہ قطرہ قطرہ نکلے | سلی نیم۔۳۰ |

## ۲۰۔ متفرق علامات

| | |
|---|---|
| ☆ مرد بیوی کے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کرے | نیٹرم سلف۔۲۰۰ |
| ☆ مرد کی جنس تبدیل ہو رہی ہو | آرم میٹ۔۱۰۰۰ |
| ☆ مرد شادی کے خیال سے باغی ہو | پکرک ایسڈ۔۲۰۰ |
| ☆ مرد ہر وقت شہوانی خیالات میں مست رہے | سٹفی سیگریا۔۲۰۰ |
| ☆ مرد میں ہر وقت شہوانی خیالات کا غلبہ ہو | ڈامیانہ۔۳۰ |
| ☆ مرد ہر وقت عُریاں چیزوں کے متعلق سوچے | لیک کیناٹم۔۳۰ |
| ☆ مرد عُریاں قسم کی باتیں کرے | للیم ٹگ۔۳۰ |
| ☆ مرد عُریاں سوئے | ہائیوسائمس۔۳۰ |
| ☆ مرد ہر وقت عضو تناسل سے کھیلے | سٹرامونیم۔۳۰ |
| ☆ مرد بغل گیری کے دوران سو جائے | لائیکوپوڈیم۔۲۰۰ |



| | |
|---|---|
| ☆ مرد ایک رات میں کئی بار جماع کی خواہش رکھے | ایسڈ فاس۔Q |
| ☆ مرد اپنے آپ کو خوامخواہ ننگا کرے | ہائیوسائمس۔۲۰۰ |
| ☆ مرد ہر کسی کا بوسہ لینا چاہے | ویریٹرم ایلبم۔۳۰ |
| ☆ مرد عورتوں سے ڈرے | پلساٹیلا۔۲۰۰ |
| ☆ مرد کو عورتوں سے نفرت ہو | پلساٹیلا۔۲۰۰ |
| ☆ مرد عملی طور پر بالکل ناکارہ ہو جائے | فاسفورس۔۱۰۰۰ |
| ☆ مرد میں اغلام بازی کی عادت کے لیے | تھائی مول۔Q |
| ☆ مرد کو بوس و کنار سے تسلی ہو | سباڈیلا۔۳۰ |
| ☆ لخن (Smegma) کی افزائش زیادہ | مرکیورس' کاسٹی کم' نکس وامیکا۔۳۰ |
| ☆ لخن (Smegma) نہایت بدبودار | سینگوئنیریا۔۳۰ |

ڈاکٹر دولت سنگھ کے مطابق سٹافی سیگریا جریانِ منی اور احتلام کے لیے مُفید دوا ہے اور جب پُر درد ایستادگی کے ساتھ منی خارج ہوتی ہو تو سلیکس نائیگرا بہترین دوا ہے۔ نامردی کے لیے ایگنس کاسٹس مدر ٹنکچر میں استعمال کی جائے تو اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیمپل نے کثرتِ احتلام کے لیے ڈجی ٹیلس۔3x کو مفید پایا ہے۔ ڈاکٹر رام لعل نے ایسڈ فاس مدر ٹنکچر کو سُرعت انزال کی بہترین دوا کہا ہے جب کہ اس کا سبب اخراجِ منی ہو اور اس وجہ سے دماغی و جسمانی کمزوری نمایاں ہو۔ جریان و احتلام کے لیے ڈاکٹر مذکور نے ایوینا سٹائیوا مدر ٹنکچر کی سفارش کی ہے۔ جلق کی عادت چھڑانے کے لیے ڈاکٹر رام لعل نے بیوفورانا مدر ٹنکچر کو تجویز کیا ہے۔ ڈاکٹر داس بشمر نے سلیکٹ یور ریمیڈی میں کوپے ویا مدر ٹنکچر کو سوزاک کے لیے اکسیر کہا ہے اور اگر سوزاک کا عارضہ مزمن صورت اختیار کر گیا ہو اور عضو میں سے پتلا سبز اخراج ہو جس کے ساتھ پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو تھوجا۔1X میں استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ جلق کے متعلق ڈاکٹر مذکور نے سٹافی سیگریا۔Q کی سفارش کی ہے بالخصوص چھوٹے بچوں میں اگر جلق کی عادت ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ جب کہ دولت سنگھ نے بھی سٹافی سیگریا۔Q کو جلق کے لیے مفید کہا